

VERRUDERM

Lauria

ÁCIDO SALICÍLICO 24%

Laca

VENTA LIBRE

IND. ARGENTINA

Acción: Queratolítico (disuelve la queratina de la piel)

Para qué se usa: Tratamiento tópico de verrugas vulgares, verrugas plantares, callos y ojos de gallo (hiperqueratosis circunscriptas). Es un agente queratolítico, es decir, disuelve durezas y callosidades. Callicida. Código ATC: D11AF

Que contiene: cada 100 ml contiene: ácido salicílico 24 gramos, excipientes: colodión elástico c.s.p

Como se aplica este medicamento: aplicar una fina capa de producto sobre la callosidad una vez por día, preferentemente durante la noche. Evitar el contacto del producto con la piel sana circundante. Realizar la aplicación del producto luego de lavar la zona afectada. Después de 5 a 7 días de aplicación remojar con agua caliente y desprender la callosidad.

Que personas no pueden usar este medicamento: no debe utilizarse en pacientes con alergia a alguno de los componentes de la formulación, alergia a la aspirina o al ácido salicílico o en el caso de lesiones o inflamación de la piel.

No debe ser aplicado sobre lunares, marcas de nacimiento, verrugas de aspecto raro (con pelos, etc), verrugas genitales o verrugas situadas en el rostro o mucosas. No utilizar en menores de 18 años.

Cuidados que debo tener antes de utilizar este medicamento: Este producto es de uso externo exclusivo. No emplearlo sobre la piel irritada en un área que este infectada o enrojecida. No debe ser aplicado sobre lunares, marcas de nacimiento, ve-

rrugas raras en donde salen pelos, verrugas genitales o verrugas situadas en el rostro o mucosas. El producto no debe ponerse en contacto con los ojos u otras membranas mucosas.

Si usted recibe otro medicamento, esta embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte al médico antes de aplicar la medicación.

Cuidados que debe tener mientras utiliza este medicamento: puede provocar una irritación local en la zona donde ha sido aplicado, acompañada de sensación de quemazón que desaparece por la suspensión temporaria del tratamiento. Si esto sucede suspenda la aplicación, y si persisten las molestias y/o la irritación por mas de 48 horas consulte con su médico. Si el síntoma para el que se usa el medicamento, persiste por mas de 5 a 7 días o empeora consulte a su médico.

¿Tiene alguna pregunta?

Comuníquese al **011 4859-8400**

Por favor lea con cuidado esta información antes de utilizar este medicamento.

Manténgase el frasco bien cerrado para evitar su evaporación.

Ante cualquier duda consulte con su médico y/o farmacéutico.

Conservar en lugar fresco y seco.

Mantenga siempre los medicamentos fuera del alcance de los niños.

En caso de sobredosificación comunicarse con:

Unidad Toxicológica del Hospital de Niños

Ricardo Gutierrez: (011) 4962-6666/ 2247

Unidad Toxicología de Hospital Posadas:

(011) 4658-7777

ANMAT responde: 0800-333-1234

Presentación: frasco x 8 ml

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud: certificado N° 58009

Elaborado por **LABORATORIO MERLINO y Cía. S.C.**

Camarones 1824, CABA

Directora Técnica: **Farm. y Bioq. Milena Batalla**

Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: 18/07/2016



**LABORATORIO
MERLINO**